

# Cinétique du Cellcept®

## En association à la ciclosporine

Etiquette patient

### Indications cinétique

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Initiation du traitement par MMF        | <input type="checkbox"/> Contrôle du traitement d'entretien |
| <input type="checkbox"/> Contrôle d'une adaptation PK antérieure | <input type="checkbox"/> Rechute                            |
| <input type="checkbox"/> Effet indésirable                       | <input type="checkbox"/> Bilan annuel systématique          |
- Lequel :

### Statut du patient au moment de la cinétique

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Patient en rémission récente | <input type="checkbox"/> Patient en rémission stable |
| <input type="checkbox"/> Patient en rechute partielle | <input type="checkbox"/> Patient en rechute récente  |
| <input type="checkbox"/> Patient en pleine rechute    |  |

### Quelle est pour vous l'efficacité du MMF au moment de la cinétique ?

- |  |  |                                       |
|--|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Efficacité maximale | <input type="checkbox"/> Efficacité partielle                | <input type="checkbox"/> Peu efficace |
| <input type="checkbox"/> Pas efficace        | <input type="checkbox"/> Trop tôt pour dire quoi que ce soit |                                       |

### Quelle est pour vous la toxicité du MMF au moment de la cinétique

- Aucun effet secondaire
- Effets secondaires modérés ne nécessitant pas de diminuer la dose
- Effets secondaires moyens motivant une diminution de la dose
- Effets secondaires importants poussant à un arrêt du traitement

### Informations concernant le syndrome néphrotique

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Cortancyl → Dose par prise (mg) : _____    | Nombre de prise par jour : _____ |
| <input type="checkbox"/> Ciclosporine → Dose par prise (mg) : _____ | Nombre de prise par jour : _____ |
| <input type="checkbox"/> Tacrolimus → Dose par prise (mg) : _____   | Nombre de prise par jour : _____ |
| <input type="checkbox"/> Autres traitements. Préciser :             |                                  |

Protidémie (g/L) : \_\_\_\_\_

Albuminémie (g/L) : \_\_\_\_\_

Protéinurie (g/L) : \_\_\_\_\_

Créatininémie (µmol/L) : \_\_\_\_\_

Créatininurie (µmol/L) : \_\_\_\_\_

Bandelettes urinaires :  0     traces     +     ++     +++     ++++

Taille (cm) :

Poids (Kg) :

Date d'instauration du MMF :

Date de réalisation de la cinétique:

Heure de Prise - la veille au soir avant la cinétique :

- le matin de la cinétique :

Dose prise le matin :

Dose prise le midi :

Dose prise le soir :

Forme : sirop / gélule 250 mg / comprimé 500

<b>Temps théorique</b>	<b>Heure réelle</b>	<b>IDE</b>	<b>Problème de prélèvement</b>	<b>Résultats</b>
<b>T0</b>				
<b>T20min</b>				
<b>T40min</b>				
<b>T1h</b>				
<b>T2h</b>				
<b>T3h</b>				
<b>T4h</b>				
<b>T6h</b>				
<b>T8h</b>				
<b>T12h</b>				