

Cinétique du Cellcept® sans association à la ciclosporine

Etiquette patient

Indications cinétique

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Initiation du traitement par MMF | <input type="checkbox"/> Contrôle du traitement d'entretien |
| <input type="checkbox"/> Contrôle d'une adaptation PK antérieure | <input type="checkbox"/> Rechute |
| <input type="checkbox"/> Effet indésirable | <input type="checkbox"/> Bilan annuel systématique |
- Lequel :

Statut du patient au moment de la cinétique

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Patient en rémission récente | <input type="checkbox"/> Patient en rémission stable |
| <input type="checkbox"/> Patient en rechute partielle | <input type="checkbox"/> Patient en rechute récente |
| <input type="checkbox"/> Patient en pleine rechute | |

Quelle est pour vous l'efficacité du MMF au moment de la cinétique ?

- | | | |
|--|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Efficacité maximale | <input type="checkbox"/> Efficacité partielle | <input type="checkbox"/> Peu efficace |
| <input type="checkbox"/> Pas efficace | <input type="checkbox"/> Trop tôt pour dire quoi que ce soit | |

Quelle est pour vous la toxicité du MMF au moment de la cinétique

- Aucun effet secondaire
- Effets secondaires modérés ne nécessitant pas de diminuer la dose
- Effets secondaires moyens motivant une diminution de la dose
- Effets secondaires importants poussant à un arrêt du traitement

Informations concernant le syndrome néphrotique

- | | |
|---|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Cortancyl → Dose par prise (mg) : _____ | Nombre de prise par jour : _____ |
| <input type="checkbox"/> Tacrolimus → Dose par prise (mg) : _____ | Nombre de prise par jour : _____ |
| <input type="checkbox"/> Autres traitements. Préciser : | |

Protidémie (g/L) : _____

Albuminémie (g/L): _____

Protéinurie (g/L) : _____

Créatininémie (µmol/L) : _____

Créatininurie (µmol/L) : _____

Bandelettes urinaires : 0 traces + ++ +++ ++++

Taille (cm) :

Poids (Kg) :

Date d'instauration du MMF :

Date de réalisation de la cinétique :

Heure de Prise - la veille au soir avant la cinétique :

- le matin de la cinétique :

Dose prise le matin :

Dose prise le midi :

Dose prise le soir :

Forme : sirop / gélule 250 mg / comprimé 500

| Temps théorique | Heure réelle | IDE | Problème de prélèvement | Résultats |
|------------------------|---------------------|------------|--------------------------------|------------------|
| T20min | | | | |
| T1h | | | | |
| T3h | | | | |