

PÔLE BIOLOGIE- PATHOLOGIE	PROTOCOLE CLINICO - BIOLOGIQUE	Réf : Version 02
Département de Biochimie et Pharmaco- Toxicologie	SUSPICION DE REACTION ANAPHYLACTIQUE	Date : 20/01/2011 Page : 1/1

CONDUITE A TENIR EN CAS D'ACCIDENT EVOQUANT UNE REACTION ANAPHYLACTIQUE
(ANESTHESIE, IMAGERIE, URGENCES)

PRELEVEMENTS

- */ **10 à 20 minutes après l'accident : T0** (après les gestes de première urgence) :
Prélever un tube EDTA (bouchon mauve) **pour dosage de l'HISTAMINE et de la TRYPTASE**
Le transmettre immédiatement (après l'avoir doucement agité) au Laboratoire de la Cavale Blanche.
- */ **30 minutes à 2 heures après l'accident : T1**
Prélever un tube sec avec gel (bouchon rouge) **pour dosage de la TRYPTASE**
Le transmettre immédiatement au Laboratoire de la Cavale Blanche.
- */ **A distance de l'accident (au moins 24 h) : T2**
Prélever un tube sec avec gel (bouchon rouge) **pour déterminer le taux basal de la TRYPTASE**
(éliminer une éventuelle mastocytose).
Le transmettre immédiatement au Laboratoire de la Cavale Blanche.

REMPLISSAGE DES BONS DE DEMANDE

- */ **Utiliser un bon d'examen sanguin du département de Biochimie et PharmacoToxicologie.**
 - **Pour l' HISTAMINE cocher la case "Autres Analyses"** au verso de la feuille et inscrire HISTAMINE.
 - **Pour la TRYPTASE cocher la case Tryptase** dans la rubrique Allergologie au verso de la feuille.
- */ **Inscrire l'heure exacte et l'ordre des prélèvements (T0, T1, T2) sur le tube et sur le bon de demande** ou l'ordonnance jointe. Mentionner sur le bon l'heure exacte de l'accident.

DANS LES 24 H

- */ **Programmer une consultation d'Allergologie.**

Date de mise en application :

Validation :

*Responsable Qualité
du Département de Biochimie
et Pharmaco-Toxicologie*

*Responsable Qualité
du Département
d'Anesthésie Réanimation*

*Responsable Qualité
du Service des Urgences*

*Responsable Qualité
du service Radiodiagnostic
et Imagerie Médicale*